

## Срединная группа.

1. Двубрюшная мышца, *m. digastricus*, имеет два брюшка: переднее и заднее, которые соединены между собой сухожилием. Переднее брюшко, *venter anterior*, начинается от *fossa digastrica mandibulae*, идет назад и вниз и переходит в сухожилие, которое отростком средней фасции шеи укреплено у тела подъязычной кости. Это сухожилие, загибаясь назад и вверху, переходит в заднее брюшко, *venter posterior*, которое прикрепляется к *incisura mastoidea* височной кости. Между обоими брюшками и краем нижней челюсти находится углубление - поднижнечелюстная ямка, *fossa submandibularis*. в которой залегает поднижнечелюстная железа, *glandula submandibularis*.

**Действие:** при укрепленной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть; при укрепленной нижней челюсти тянет подъязычную кость вверх.

2. Шило-подъязычная мышца, *m. stylohyoideus*, имеет тонкое уплощенное брюшко, которое начинается от шиловидного отростка височной кости, идет вперед и вниз, ложится на переднюю поверхность заднего брюшка двубрюшной мышцы. Дистальный конец мышцы рас-щепляется и, охватывая двумя ножками сухожилие двубрюшной мышцы, прикрепляется к телу и большому рожку подъязычной кости.

**Действие:** тянет подъязычную кость назад, вверх и внаружу.