

# Клиническая симптоматика ОЛ

При остром кардиогенном отеке легких пациент

- ✓ жалуется на одышку, нехватку воздуха, затрудненное дыхание, страх смерти, боли в области сердца.
- ✓ Глаза широко раскрыты, на лице испуг. Больной стремится сесть и опустить ноги с койки или встать. В таком положении тела приток венозной крови к правому сердцу снижается, давление крови в сосудах легких уменьшается и развитие отека легких замедляется.
- ✓ По мере нарастания гипоксемии и гиперкапнии возникает психомоторное возбуждение, эйфория, гипостезия, появляются признаки психических нарушений (зрительные, слуховые галлюцинации, бред).

Сердечно-сосудистая система на начальных этапах кардиогенного ОЛ функционирует в гипердинамическом режиме - нарастает частота сердечных сокращений, повышаются артериальное давление, ЦВД, минутный объем кровообращения. На фоне гиперкатехолемии, нарастающей гипоксии и гиперкапнии появляются различные формы аритмий сердца (пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, фибрилляция предсердий). Затем развивается депрессия функций сердечно-сосудистой системы - артериальная гипотензия и снижение сердечного и ударного выброса. Тахикардия сменяется нарастающей брадикардией, угнетением сократимости миокарда.